

**DE
MENSTRUATIONE
MORBOSA
DISSERTATIO
QUAM AD...**

Carlo Leonardo



DE

MENSTRUATIONE MORBOSA

Dissertatio

QUAM

AD LAUREAM MEDICINAE ACQUISITURAM

IN LYCEO PATAVINO PROPOUIT

CAROLUS LEONARDI

PATAVINUS



PATAVII

TYPIS PRESSAE

MICHOLII



■

■

—

DE MENSTRUATIONE MORBOSA

Inter praecipuas causas morborum mulierum ab omnibus nominatur menstruum irregularitas, ita quidem, ut a pluribus auctoribus haec fluxus regularitas quasi norma atque mensura pro foeminae salute habetur. Quae de re mihi in animam venit exponere aliquas circa aberrationes menstruum : physiologicae eorum conditione, et tali pacto non plane inutili scripto legibus academica sublebam, quae aliquid de re medica contribuere ad lucem adsequendam non jubeant.

Multiplices sunt fluxus mensui a norma aberrationes, quae omnes facile in sequentes ordines relinqui possunt:

- 1) Menstrum deficientis, aut nimis parvi — *Amenorrhoea*.
- 2) Menstrum suppressum (retentum in utero ca-
vi) — *Menostasis*.
- 3) Menstrum profusum — *Menorrhoea*.
- 4) Menstrum difficile, retardatum — *Dysmenor-
rhoea*.
- 5) Menstrum quoad locum aberratum, erratum.

CAPIT PRIMUM

Menstruus dyscrasia aut nimis parca.

ANAMNESIS.

Sub Amenorrhoea pluresi pathologorum illam intelligunt statum morbosum, ubi sanguis, qui, aetate, climatis diversitate constitutioneque sequenti muliebili spectat, et pectus mulierum periodicis ex-et accendi debent, aut in effluvia non morbose retardatur, aut parca quantitate cum difficultatibus exoritur, aut vero penitus supprimitur. Qui stygon vocis spectant solammodo alium eorum Amenorrhoeam dicunt.

Non omnis Amenorrhoea morboſa. Cum menses, uti a physiologi sciunt, pro diversitate aetatis, temperamenti, climatis, constitutionis, vivendi generis non in eam virgine eodem apparent tempore, sed juxta gradum evolutionis physicae et psychicae multipere variant, nullius in tantis Amenorrhoeas harum causis respectum habet, eporet. Non tunc solammodo Amenorrhoeam morboſam dicis, si symptomata adferant, quae naturae consuetudine ad eversionem voluntur, menses tamen illi non obstitibus non sequuntur. Oriatur nunc, propriis in virginibus consti-

tionis irritabilis et sanguis phlegm, vultu guttillam molli: irritatio idiosyncratica, sympathica, spasmodica, inflammation aut quicumque alia processus morbosus; deperditio texturarum organicarum, diarrhoea, scirrhus, polypus, chlorosis, hydrope etc. accensae eliciunt symptomata secundaria; cephalica diversimoda, tussis, catarrhus varii, edematosis, deliria, angor, palpitatio cordis, melancholia, apoplexia, haemorrhagia, haemiplegia etc.

Causae Anomorphosae dividuntur in dispositivas, occasionales et mechanicas.

Dispositivae sunt illae, quae vel a constitutione generis individuali, vel a speciali uteri ipsius, vel denique ab educatione vitaeque genere dependent. Immediatè praedispont ad morbum, de quo loquimur, habitus lymphaticus atque nervosus, sensibilitas organorum sensuum juxta magis atque minus aut debilis. E contra educatio ac vitae genus, quae habitum ac sensibilitatem quodammodo modificat, ad causam pertinet mediata agentis.

Si ad haec etiam aliae potentiae debilitantes accesserint ut: habitatio in locis depressis, humido-frigidis, paludosis, victus parvus aut immodicus, defectus sollicitudinis matris, vita solitaria, aut e contra labor nimis et ex hac defectus sanis foemulis minus vel infirmis haec circumstantiae parum incrementi capiant, sed in-

certa tribuantur generis aetatis hanc convalescentiam periculis longe superant, quin, quod oportet, sanatis salutariter.

Causae occasionaliter adveniunt: reliquiae aetatis corporis captae, venarumque citius necessitates institutae, haemorrhagiae variae, dolor stercis, inflexus ceteris ejusdem penetrantia, alvus perperam, morbi vari generis, propriis infestationibus, libris characteris nervosi, diarrhoea profusa, haemorrhoea additum jactura, denique utriusque putredinis graviter, rebusque utriusque consuetudo, propriis terre, ira, lectum etc.

Sunt denique et causae mechanicae haemorrhoeas inducentes ut: stercis bymnosis, librorum superam et inflexum rapina, ceteris utriusque ex-et interni, stercis abstrusis formos, aut paulatim deficiunt.

Pec divergentis causae, constitutionis aegre, morbi durationis morborumque considerantur, in quae haemorrhoeas transit, prognosim variabit. Sicuti difficilis est, quae ex causis praedispontibus orta fuerit, quam ea, quae occasionalibus originem suam debet, licet posterior aspietatur affectuorum acutiorum fertilissima sit mater. Haemorrhoeas longiori tempore durantes, licet omnia impendenda optent, non alii post longum tempus, neque post plures vires usula,

et si tibi fluxum revocare colligerit, irregularis erit, omnes apertus typum. Amenorrhoea, quae interdum cum melenisibus menstruationis incedit leuorem vitam aperire solet. Sed haec melius nihil aliud, quam cunctis ratione medicatrix medicum in mensibus revocanda adiuvant. Si haec deficiant, tunc trista erit prognos, cuiusque ea difficilis, quo plures complicationes, in gentium retentionis irregularis meliorumque consequentiam, ortus fuerint. Unde jam Hippocrati: «*Menstruatio, quae post sex menses non redit, finem invariabilem reddit*».

Menstrua, qui ex vitalitate exacta retinentur magis leuam adhibent prognosin, quam si qui ex debilitate exstant, suppressio denique mensium ex causis mechanicis orta in genere nulla vel saltem exigua praecedit difficultas, operationes videlicet chirurgicae facili succedunt.

Cura Amenorrhoeae in prophylacticam et radicalem dividitur. Prior demum daret indicationes, videlicet:

1) Evictio causarum praedispositionum impeditur, ut dispositio haec jamjam infecta, haec quantum in potestate medici est emendetur.

2) Ut causae occasionales vitale auerantur.

Indicationi prius accedit, causas praedispositionum superius memoratas vitale vitando; in

rioribus tamen casibus medicamentibus aegrum adgreditur medicus. Si organa genitalia valde sensibilia essent, multa pota diluente balneo-que tepida tracteret aegrum: si contrarium locum habere, balnea frigida, medicamentaonica, aquae ferreae etc. in usu traheret, oportet. Secundae indicationis aetiologicalae, si vitare ja-bentis, quae superioris tituli causarum occasionem edulcorat.

Cum vesicula. Et progressu potest, medeam, utiqueque Anamneseos adgreditur, probe investigare debere, utrum haec simplex vel complicata, recens vel antiquata, nova vel affectus alius curis sit.

Si Anamneseos simplex, individuum vero debile atque lymphaticum esset, si locus quem aegrum inhabitat umidus, humido-frigidus et pathological esset, haecque insuper parum ac pessime qualitatis nutrimento visceretur, tunc methodus stimulant quae maxime conveniret. Medeam in tali casu curis, si nutrimenta digesta lactis, mellis aut mentis, quidquam stercoris, jureculi carulem concentratam, parvulum vinum generum aegrum porrigi curamus, copulantesque debilitatem edulcorat medicamentibus tamen seducitibus, aromaticis, choleris ac narcoticis res-bonae studemus. Quamvis Anamneseos recens

nullaque aliis morbis complicata fuerit, therapia
vix momenti ad illam tollendam sufficiat, in de-
spensis volumine confusus ad sic dicta *Eosmoyaga*
confugiendum, quippe medicamina quae a medi-
cis non in finem prescribuntur ut monstrum,
quae aetate, temperamento, habita vitaeque ge-
nere spectatis, non apparere debent, ut jamque
procedentis ab infans quidam, fortiori aetate ad-
lecta, frigore aetate corpore adulescentis subito
suppressis, revocatur. Monendum tamen, quod
cum illis cautissime merendum sit, distendum
ab aetate sua, si irritatis quidem membranis
mucosae ventriculi aut reliqui tibi intestinalis,
vel morbosae quidam affectio utriusque ade-
ret. *Eosmoyaga* colibentisiana sunt: crocus, rosa,
salix, *shlethiam*, *chamomora*, *divera* *praeperita*
mentula, *perpetia* *drastica*, *helleborus* *viper*,
alic etc.

Anemorrhoea frigore aetate corpore adulescentis
orta, nequissime potius tepidulo levi diaphore-
sia morati colli, praepensio si aegro, atropia
bene tota, lectam non decet. *Anemorrhoea*, quae
aetate potius aetate quibus originem suam de-
bet, praepensio si aetate aetate facit, sic
dicta aetate aetate *jagulitae*. Adhibetur in
hunc finem *lamenta* ex infuso *borum* *chamomilla*
cum oleo; interos infuso *melisse*, *borum* *cha-*

monilia, anthes cruges cum barba, pueri-
les species cum pulis delicti, parvo, luto et
expensatibus frigida, arua species et diuina,
apice aique preputa.

Ammonia, quia voluente collectiones in-
fluuntur, coadunatur, antipodistica. Inven-
da est methodo. In tali cura videretur aut
topica dupliciter singula ope lincolina, aut
coadunatur, interne scoposibus aduocis, turpiter
luculentis, vel ammonis, vel aduocis, vel aduocis
agregia aduocis, interne aduocis. Aduocis
preputa luto coadunatur et repens ad ge-
nalia, postea cum duto et tale aduocis ad
genas aique aique duto coadunatur. Pre-
puta luto genas, postea aduocis aique
purgatibus eliminatur, necesse est. Conueniunt
in hoc cura; infusa haec: Vincennes, vel amara,
amara duplic.; in grade majore luto aduocis
aduocis, aduocis aduocis, aduocis aduocis,
aduocis et alia. Ammonia, quia cras mechanica
origines non debet, coadunatur coadunatur
aduocis. Sic amara, amara alique viti co-
adunatur, secundum legem purgationis tractentur.

CAPUT SECUNDUM

Menstrua Suppressa = Menstrua.

Emmenagoga, et cum hoc et alii auctores, sub menstralis et retentis et suppressis menstruum designant, alii cum cum dysmenorrhoea synonymam dicunt. Differt Menstralis ab Amenorrhoea eo, quod illa locum habente, fluxus mensuum penitus praesens, ab ingruis quidem, factiori minus affectu, sine menstrualium introitu, vixit praefori sine instantia etc. subito interrupta, cum e contra Amenorrhoea mensuum, qui ante jam periodice fluxerunt, statuto tantum tempore non redeunt, retentionem designat.

Causae menstrui suppressi easdem fore sunt, quibus menstrui retineri vel retardari solent. Nominatim supprimuntur menstrui durato fluxu difficilius solvi, menstrui partes sibi potentes non satis obteperantibus, nutrimentis digestis difficilibus uti farinosis, fermentatiori subjectis, etiam potulentiorum frigidorum; veluti potulentibus gravioribus, terrore videlicet, ira aliisque valida animi commotione.

Neque efficitur quod menstrua pedantque habet, multo ab illis, qui Amenorrhoeam sequuntur, divergi sent, sed quod citius ingruat repetitaque ad majorem decessum decedant: ut

quantas quippe brachialis praepore caniculae functionem arguitis, cephalica divisione, utero, endopleura, larynxia, aneuris, vena, oedem et ulona pedum; dyspepsia, singulus periodicus, abstractiones, chlorosis, hydrops; deinde haemorrhagiae pulmonum, epistaxis, haemoptoe, etc. Nec darent enim, ubi reherensuloni dolorem extenui sui locum circumscriptam in abducent occupant, quibus interdum et inflammatione diversorum organorum et febri accendunt, segnum sacraclabatur.

In praeparati faciendo, ad ea saluadventis medicis oportet, quae de praeparati in Anemorrhoea instituenda praecipiant.

Nec diverge multum ab illa Anemorrhoea diversa, nam talem modum satisfaciendum habet indicationibus, quae in Anemorrhoea pertractando evadunt. Tales sunt:

1) Causa morbi extenua, et fluxum menstruum retinere.

2) Symptomata morbi in gratiam modum suppensuloni orto juxta eorum charactera tractare.

3) Regimen dieteticum morbo congruum ordinare.

Pro diversitate causarum talem indicentium etiam therapia diversa est. Quae reliquis cor-
poris restanti adhibere ortum debet attentissima

potibus diaphoreticis, levi diaphoretica morantibus et acropricticis tentanda erit. Ubi vero fluxus de calidi potestate gravis suppressus est, tunc potulenti refrigerantia, potus Rivieri, infusa florum liliorum, infusa herbarum melissae, florum chamomillae, in casu urgente antispasmodica lactaria: valerianae, castoreae, liquore cornu cervi accedant, opium, pulvis Doveri atque haec genera vix respondent medicorum. Quae abusu potulenterum acidorum originem debet morantia, absorbentibus uti: carbonis magistralis, carbonate calida, lipidibus castoreorum etc. tractantur. Si denique cordis patiens in causa esset, haec auxilia, praecipua spectantia et parva sunt clinicaenda. Symptomata morbosae, quae ex subito suppresso fluxu in locum valent atque non raro discriminis plenas sunt, pro diversitate characteris, etiam diversa therapia adgredienda sunt. Sic congelationes ad diversa organa praecipue ad cerebrum, inflammationes synocham annulantes, haemorrhagiae pulmonum, epistaxis etc. therapiam antiphlogisticam praecedentes expectant. Quae de crura venarum in brachio, vel ubi illi valent in extremitatibus instructae, hirudines in internis femorum facile applicandae, pro usu interno citram, pulpa tamarindorum, cremor tartari, vel Scoggetti, potus diluentis, virbo cassis, quae ther-

plura antipathologica constituant, utrasque parti-
pula habemus et externas quondam adiacentes,
quibus, experientia teste, cum internas egerie in-
falibilis. Illas spectant: pediluvia, balnea vaporosa,
horrentationes et cataplasmata ad gastera, semi-
cupia aromatica, frictiones femorum cum pom-
maco sacro substantiarum resinosarum, vel sto-
maticarum græcis, denique equitatio, rectio in
rhoda etc.

In subjectis irritabilibus, apud oboculis man-
us reserare strobilum infer rad. valerianæ, flor.
chamæ., herbas melissæ, menthæ, millefolii,
ipocistidis relecta dos, pœn. Doveri, opio, cum
siccis, autoreo etc. Remanegoriam de dietarum
usu, ad illos aliam subiungatur cura, ubi sub-
jecta torpida, constitutionis lymphaticæ tractanda
habemus. Recinerit tamen medicus quod in illa
disponenda, utram custodi opus sit, quodque
exiguâ dosibus, sæpius tamen repetitis, parari
debeat.

Quod denique ultimum indicationem adinet,
de ordinando regimine dietetico videlicet, eru-
ciatur ex, quæ capite priori de regimine dietet-
ico præcepimus.

CAPUT TERTIUM

15

Menstrua profusa - Menorrhagia.

Menorrhœa, cujus ætymologia significationi non satis correspondet, communè plurimarum pathologicarum causarum, illud vocatur profusam sanguinem ex utero sterili, quod quantitate menstruationis superet, aliisque, quæ contingere solent, tempore appareat.

Quævis menstrualis profusa excretio symptomatibus stipatur, quæ illam seu antecedere seu sequi solent. Præcursoribus pertinent in pluribus casibus: debilitatis sensus in omnibus partibus, molestiæ vertiginosæ et cephalicæ, lumbago, doloris juxta spinam dorsii decurrentes, anxietas, dyspnoea, cardiopalmus, sagiens cum nocte alternantis horripilationes, siccitas oris, nausea, ipsaque vomitus. Sanguis excretus in fluide vel coagulato stato est, interdum pseudo-membranoso, membranæ deciduas Hunteri non absentiè tactu tactus conspiciebatur.

Symptomata, quæ menstruationem profusam, quippe quæ major sanguinis copia excretatur, quam normali corporis rigore et integritate concedatur, sequuntur, non minus gravis sunt, quam illæ amenorrhœicæ, quæ sine organæ quævis citantes ad normam vires diutius perdurant.

Aberrare potest menstratio vel quod quæ-

litatem acris sanguinis vel quoad typum, si videlicet frequentius quam par est, contingat, vel vero aberrat quoad durationem, si diutius quam usus daret. Qualitatem pro diversitate circumstantiarum valere jam e physiologia scimus.

Cum haec ratione norma dictari nequeat, medicus in casu quolibet determinando normam, quae physiologia docet, mensurari oportet. Quae typum et durationem naturalem adhaerent, neque a physiologia scimus, ea diversitate variare, quae de causa medica et hic res juxta physiologiae praecepta deducit.

In casu menstruationis nimis copiosae indigestio effluvia non raro individua sanguinis plena vel et nimis tenera, quibus dispositio ad coagulum, de quo loquimur, inerta sit. Ferunt etiam menstruum excoqui, quae sanguine adhucum adegent, infirmitates variis generis uti sunt; vis externa adhibita, irritatio per vapores, menstrua priores, infestationes, perniciem; prolapsus, vulnus, hydatides, utriusque variae disorganisationes sicuti scissurae, carcinomata, chystrata et polypus irritatio etc.; vel e contra quae sanguine in illa organa inflammation impediunt, vel saltem quaedam ex utero refluere retardant ut a. gr. pyrochymia uteri et remota irritatio, torpor aut contractio. Nec deest causa uti sit leprosa, haemorrhagica,

dia et potestate irritabilis, medicamentum calidiusculum praesertim diarrhoeae clausae, emmenagogue et diuresis in usum vocatur; deinde motus corporis nimis per cursum vel per saltationem, coitus nimis etc. motus profusus provocant.

Prognosis pro diversitate constitutionis, temperamenti, aetatis, occasio, vivendi generis, densitatis et quantitatis sanguinis cunctis variis. Individuum debili constitutione donatum, si frequentem sanguinisjectionem patitur praesens facit, malis ac gravibus collectandis habebit malis; enaculatur de die in diem corpus, sequitur chlorosis, hydrops, plethoris, tubercula, denique ipsorum organorum profundam morbosam metamorphosin, obortitur nempe morborum letalium semina, totam claudet vitae normam.

In cura menorrhoeae medica causa consideranda ac status praesentis aegri uti nec non momenti causa exacte scrutatur oportet. Indicationes, quibus satisfaciendum habebit erunt: 1) causas, quae illud producti vel efluxi sunt, amovere; 2) secretionem profusam ad normam reducere, et 3) vim dispendio sanguinis nimis praestitam erigere. Quae prima dicitur indicatio momenta therapeutica pro diversitate causarum, diversa erunt. Causa licet non prospecta atque remota, moribus tamen ac non obstantibus rationibus, me-

dicitur inflammationi acutum non accingit necesse est, praeparanda et in gradum sicut dependit sanguine usqueque suorum varium, tumescit, lymphaticis aliisque hujus generis symptomata intraverint. Quae ad ea praeventiunda requiruntur, sequentibus abstruuntur. Tacent aegri in lecto quiete aliam observant horizontalem; aër illius scilicet et temperatur; pro una interius potiguntur acida minuida uti acid, sulphuricum dilutum, etc., acid. Halleri, acid. phosphoricum in infuso herbarum mellissae, menthae crispae et pipentis. In casibus vero ubi catamenia profusa in robore ac bene nutrita apparent, praeparanda in et externa casus irritabilibus, cum pulve piceo forti, riburata, praesentibus simul collectionibus fibrilibus vel inflammationibus aut in placentia casibus dolore, acuta ac aliis aliis manifestantibus, methodus delibata indicata est. Quae de casu therapia antiphlogistica pro se nota et generatim in casu indicanda; acuta vero in hanc vel, si maris, in extremitate inferiore, propinquantur potentia frigida viciaque percuti; movetur alius laetibus occiprocicis vel chyumate quodam cicero; stercophorum aegrum scilicet et temperata, situs in lecto horizontali occupatur, quieti tam corporis tam animi nec ulla reflexio turbetur. Remedia externa sic dicta septica in talibus casibus prae-

capla sunt inglanda. Horum vero virtute ad illos depetitus restringitur curam, ubi profusum, nulla alia resque introducunt, vitas faciemque extinguere videntur. Si ob nimiam angustiam depetitus regni symptomatibus nervosis molestari inciperet, tumenque characteris debilitate, tum post cito ad nervos stimulis confugimus. Oleo scilicet, oleum chamæceri, menthe pipéritæ, rosi, valerianæ, infusioni fl. chamæceridis, ardens, red. valerianæ, sapidis, oleum aromatici, liquor cornu cervi associatus, camphora, mentha plerumque illis hujus generis in usum vocata. egyptio in plurimis casibus curamatur effectus.

Menstrua profusa, quæ in gravem statum hæmorrhoidalem vel obstructionem viciorum abdominalium orta sunt, sanant, si tibi morbum primarium, presentis videlicet morbi causam, subferre contigerit. In his itaque morbis curam veram oportet, adgredieris illis medicamentis, quæ pharacologia solvenda vocant; quæ refert, si diagnosis juxta sitis, profecto morbum secundarium, menstrua videlicet profusa, tollas, quin opus sit tenet locum menstruationis inhibitionis evadere. Si autem cognoscas hæmorrhoidales profusum menstruationem sicuti subvenit, depetientes singulis locis, hirsutis videlicet in regione labiali vel in perineo applicitis, egyptio

adferunt segnes dolores. Depletionem sanguinis interdules, uti jam superius monuitur, tantum ad illos restringatur casus, ubi symptomata phlogosæ copulæ expetenda nobiliora, praesentia sunt, segnes periculo vitæ exponerent, quo in casu aliquæ restrictiones in brachia vel pede institui debent. Aliter res se habet in hæmorrhoidibus, quæ ex debilitate atque hinc oriunda lassitate organorum originem trahunt. In his regionem viæ alimentum adhibentes segnes minime vitæ discrimini subiacerunt. Oportet in similibus casibus uti roburantibus, amaro videlicet ac teracis ut castæ, extractum crocæ, minoris, trifolii libr., millefolii, cardii benedicti, olei chinæ, martialis, æque martialis etc. et libram strobilorum sedtæ, viribusque vitæbus junctis ad usum deprecæ accutæque. Regiones digestivæ atque Menstruæ se præci adaptant ut necesse sit, si individuum quod morbo afficitur juvenis, robustum ac bene nutritum sit, tum in præfata therapia debilitata adhibere, citius parca, eoque parca nutritionis victu utatur oportet. Crevit idcirco ab omibus curis, rursus solenniter præcili curam sensibus, vel nutritionis ex regno vegetabilium exceptis. Sicut largis aquæ fontibus hauritus solent. Contrariis indicabitur dicta, si individualis exhaustum, male nutritum fuerit, molis-

que oppositas subiacent causas. Ceterum hoc faciendo jam in progressu momenti sunt.

CAPUT QUARTUM

Menstrua difficilia, dolerifica - Dysmenorrhœa.

Quomodocumque decessu menses, de quo loquimur, vocare velis, semper menstrui cum molestiis variis, vicinas videlicet prostratione, epistaxis, doloribus aliisque functionum turbis incidentiis intelligis accessus est. Noluit hoc vel tantum prius menstruatione locum habentis presentes esse possent vel, quod sæpe videtur, toties miserabile succedatur intervallo quoties, tempore intercalari præterlapso, accessus decessu fluere incipiunt.

Symptomata, quæ menstruationem difficilem jam præcedunt, jam sequuntur, æqueatibus complentur; debilitas in omnibus corporis partibus, horripilationes juxta spinam dorsi decurrentes, dolores velantes spasmodici in regione hypogastrica, lumborum vel dorsi sive ad extremitates inferiores usque extendentes; cephalalgia, vertigo, epistaxis, hæmoptoe, anxietas sensu, orthopnoea; colica inflammatoria aliæque inflammatorie affectiones in epigastrio; colica nervosa, cardialgia, nausea, vomitus, hypotymia etc. Symptomatum ex acris characteris non omnia in omnibus indivi-

dent corpus tenere in conspectum veniunt. Quae
serpentes observantur sunt dolores vehementes
qui eodem modo in ipso utro latere videntur,
atque jam inflammationem, jam vero nervorum
praesecurant characterem. Dolores hi, qui propriis
codicem ac dicere catenariis consistunt, ni-
hilum hinc inde utri sensibilitati et quanta inde
est, frequentius vult illas angustias sicut tan-
gula, vel et leviori inflammationis gradui, subinde
lentae ventris organice hic locorum incipienti
et incrementi scilicet debentur. Quoniam, dysme-
norrhoeos locum habente, sanguis in variis cas-
ibus super quibusdam fuit riva, sed plerumque
guttatim exillet, pathologi nonnulli eam cum
stragula equiparant. Et revera nostri dys-
menorrhoeos illi aliud est, quam Arctii dicunturque
veterum auctoritas «*stérilitéas uteri*».

Causae dysmenorrhoeae sunt diversissimae. Ad
eas generatim, praeter causas tactibus scilicet,
proprias quoque reguli dispositionem extra du-
bium possumus est. Constat autem propositio illa
in malum de quo loquimur subvertendam propiis-
simè in plethora universali, quae nimis producti-
vitas utrum debet, quae fit ut functio ventris
utro turbetur debeat. Vitium contrarium, debilitas
semper universali, aethismo tamen prevalente,
idem malum producere potest.

Emet et sunt eduxi modo videretur, qui dissecant quendam anguineis, vel villosi rancore anguliferos; alii, qui abundantem vel deficientem sensibilitatem systematis reproductivi; alius alii, qui juxta strictiores aut laxas leues texturas utriusque subesse dicuntur.

Causa architectonica admodum variata pectoris nostri regiones diastrophicas commutat, namque corpora neglecta, aut impropria, debilitas in cunctis morbi ejusdem progressui apta; deinde potentia pathologica fervere, aut debilitatem vel sensibilitatem regentes uti eductio perniciosa, utitur pathologica deprimenda, abortus progressus, villosi uteri, cicatrices, tumores, indurationes, scissuras etc. Tota Morgagni antrum hanc interdum etiam utero in evolutione sua retento, alio parvo ortum debet.

Prognosis, pro divergentia causarum dynamico-rheumatis indurabilium, admodum diversa erit. In virginibus juvenilibus speramus fore, ut tractu temporis sua structura anatomica, quae anguineis in illis accumulationibus producat, sensim sensimque cessent, quo facto et ipse dependens coelestis. Minus laeta erit prognostis, si debilitas universalis, sensibilitas educta aut aliter commota, quibus universalem medicum imper, sensibus diffinitionibus subsistat. Infantis redditur prognostis ad-

hac eo quod talis individuum raro gravidæ fuit, et si prægravidetur, abortus plerumque sequitur.

In tractatione dysmenorrhœæ dum habemus explorandas indicationes principales, apte:

1. Symptomata graviora debellare eorumque causam auferre, et

2. Nervosam tensionem liberam restituere.

Causa morbi et ipsi interdum eorum effectus, hinc pulcrè explentur indicatio eorum solo accurrendo. Ut hoc fiat, remedia naturæ symptomatum ex causis diversis originem trahentium adaptata sint oportet. Dispositio, eorumque dominum sit generis, indicatione congruo derivatur. Sic subjecto plethorico, constitutione viriditate, ubi refrigerium præcessit, atque abdomen durum, dolorificum, pulsus vero frequens durus tangitur, insistenti refrigerio, syngoniam præstare solent. Dispositio a contra ex debilitate universalis, cum sensibilitate adusta, nervosa, series roborentibus in usum vocata, succedebitur. Causæ excitantes solo accedunt. Regimen dieteticum morbo sit congruum, sit imperis cunctantur, motus corporis instituitur, debiles in causam morbi quædam prægressi actus medicamentibus congrua tollitur, potiusque plethoræ inventus solo vitentur, nervi paternati deprimendis fugiende, atque rite uti topica congrua methodo tractanda.

Quæ secundum indicationem adhiberi, necesse
est scilicet mensuræ restitutionem, et in capite
plura sedes pertractari; quare lector bene-
volus illa enumerationem colligere velit. —

CAPUT QUINTUM.

Menstrui quod locum aberrantia.

Menstrua vitiosa.

Menstruationis et quæcumque detrahit causa sup-
primis aut vitium immixtis, vicinis quædam san-
guinis secretiones obducunt, quæ, cum a viis na-
turalibus deviendo in illis plus minusve secretis
organis in conspectum veniunt, menstrui quod
locum aberrantia vocantur. Habent secretionis hæc
id peculiaris, quod plerumque per periodos men-
struas redeunt, atque fluxus menstrui ex vitio
rediens tempore rediit viciis agat.

Vix leviter in organum nulliubi officium
naturale aut locum quendam in superficie mem-
brarum mucosarum aut dermide externi, in
quo, menstrua suppressa, sanguis prorumpit
non sit visum. Observationes clarioræ virorum
circa rem hæc notatas tam multiplices sunt, ut
impossibile sit eas hic adducere. Epistole,
haemorrhoides, hæmoptæ, mictus cruentus quæ
suppressione in gratiam menstruationis suppre-

viata sunt. Nec deficiunt casus ubi singulis re-
structionibus succedunt per papillas minutarum, per
puncta laryngea, per mentem auditoriam inter-
nam, per superficiem internam talem interstima,
per umbilicem, per tegumenta verticis generum,
apices digitorum etc. extulerit. Secretionibus his
veris, quocumque ducunt loco apparent, sym-
ptomata quaedam procedunt, quae motum in-
clinationem versus illam locum tendunt, quae se-
dem secretionis constant, vel vero congestionem
in illo organo, in quo rursus secretio obtinet, in-
dicunt. Sunt tamen et casus ubi symptomata haec
aliqua sunt insensitio, quia tunc non raro pa-
pillae deficiunt, praecipue si probris haec
jam pluribus viabus releverit, et hac ratione ar-
gumenta nullibi, ut dicunt, habitare factum
sunt.

Causae, quae haemorrhagiam inducunt, vel men-
ses jamque laetitia subito suppressere valent,
etiam motum de quo sermo est in locum edere
valent. Interdum et mechanicae causae prope-
ricando nolo parae sunt, ut vel coarctatio, in-
durations et obstructions orificii uteri e. gr. placentae
defectus etc.

Progradi ut plurimum valens laetitia. Nam haem-
orrhagiae haec non talibus, ut de aliis scimus,
expantur parvulis, quae tamen, quod in textura

terminale e. gr. in pulmonibus locus habet, profluens sanguinem per longum tempus, non raso et usque ad usum elinctoriens, ubi menstruatione cessante et ipsam cessabit profluere, perire potest, quia tunc quodam modo digesti in organum nullibi existunt. Perire videtur et mens nervosum vicibus subito suppressa.

Si cum cum menstrui fluxu, et usum a memoria calculetur profusum, tam amplius profusus progreditur, quoniam usque propter humorum jure usque dependiam facile discutiatur vitae exponi potest.

Præ, quæ medicis in curanda hac affectione adhiberi debet, in eo positum est, ut naturalis menstruum fluxus restitatur, quo restituta, et ipse cum sponte dependunt morbos. Quod medicis, quæ indicationi hinc principali subsistent, ostendit sunt, quibus capitibus prioribus mensis restituta et suppressa revocari debent. Notandum tamen in hac morbo affrendis, præsertim ab acris exacerbatibus evanescere solitum esse, quibus tantum debet ut naturalis menstruum fluxus restitatur, quia imo potius congrua sique profusum vicibus solent magis regere.

Theore Defendendae.

1. *Anaerobionia non semper morbus.*
2. *Quibus dolorifica sunt menstrua, raro praevia sunt, et si sunt, abortus plerumque sequitur.*
3. *Perichloria non sunt semper inflammatoria.*
4. *Hystericis in pleuritis choreicis frequentiores quæ communi creditur.*
5. *Geni epidemici capitis est maxime in quæ morbus.*
6. *In motuibus cadavericis maxime attendendum est, ne morbo attribatur, quod mortuobus.*
7. *Sadæra habituales calidiores servant, audaces suppositis morbo innoveris signis, audaces calidi calidiores calidiores mutant.*
8. *Glaucis inflammationem producit, et primam anaphylaxiam illi.*
9. *Peritonitis per acutis rite sterilitatem inducere solet.*
10. *Non datur morbi forma, quæ ab helminthiis simulari non possit.*
11. *Inter acuta helminthiis symptomata etiam quædam retulimus acribilia tanquam certam habent.*
12. *Omne qui credit medicum ad faciendam medicinam non legem, in errore versatur.*
13. *Inter medicos ancients pericula est ac maxima laudo digna.*

